

漢方薬

桂枝茯苓丸エキス錠OM

⚠️【使用上の注意】



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

下痢

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【成分・分量】本品1日量(9錠)中

「日局」ケ イ ヒ……2.0g 「日局」ト ウ ニ ン……2.0g
 「日局」ブ ク リ ョ ウ……2.0g 「日局」シ ャ ク ヤ ク……2.0g
 「日局」ポ タ ン ビ……2.0g

上記生薬より得た桂枝茯苓丸エキス(1/2量)1150mgを含みます。

なお、添加物としてクロスカルメロースNa、トウモロコシデンプン、タルク、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、セルロースを含みます。

【効能・効果】比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症^注、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび

^注「血の道症」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

【用法・用量】次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。

(食間とは、食後2～3時間を指します。)

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	3回
15歳未満5歳以上	2錠	
5歳未満	服用しないで下さい	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出るがありますが、効果には変わりありませんので安心して服用して下さい。

【お問い合わせ先】伸和製薬株式会社 情報管理室

〒116-0003 東京都荒川区南千住5丁目17番8号

電 話：03(3807)3780

受付時間：9時から17時まで（土・日曜、祝日を除く）

販 売 元 **日邦薬品工業株式会社**

東京都渋谷区代々木3丁目46番16号

http://www.nippo-yakuhin.jp/

発 売 元 **伸和製薬株式会社**

東京都荒川区南千住5丁目17番8号

製造販売元 **大峰堂薬品工業株式会社**

奈良県大和高田市根成柿574番地