

押し上げる

服用の際は説明書を必ずお読みください

五疳強心剤 回春仙 45粒入

第2類
医薬品

△ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の強心薬

👤 **相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- | 関係部位 | 症状 |
|------|--------|
| 消化器 | 吐き気・嘔吐 |
- 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【**効能・効果**】 心臓病、立ちくらみ、心悸亢進、腹痛、気付、盗汗、胸腹の痛み

【**用法・用量**】 通常大人1日1回1粒
但し症状により2粒服用してください
なお毎日1粒~2粒連続服用してもよい

- 定められた用法・用量を厳守すること
- かまわずに服用すること
- 15歳未満の小児には服用させないこと

製造
番号

使用
期限



販売元

伸和製薬株式会社
東京都中央区日本橋人形町二丁目15番15号

製造販売元

昭和化学工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場157番地

お問合せ先 TEL 0748-88-2174
受付時間 9:00~17:00
(土、日、祝日、弊社休業日を除く)

副作用被害救済制度
☎0120-149-931



五疳強心剤

ごかん

心臓病、立ちくらみ、
心悸亢進、腹痛、気付、
盗汗、胸腹の痛みに

1日1回1粒

45
粒入

五、疳薬とは、
五臓の働きが弱まること、
また五臓のバランスが
崩れることによって起こる、
さまざまな症状(動悸
(どうき)、息切れ、立ちくらみ、
寝汗等)の改善に用いる
薬をいいます。

【**成分・分量**】 2粒中
ジャコウ 1.5mg ゴオウ 1.5mg
センソ 2mg サフラン 0.5mg
チョウジ 6.5mg ニンジン 49.75mg
ユウタン 1.25mg ハンピ 5mg
クコシ 50mg カシュウ 50mg
サンヤク 40mg イカリソウエキス 10mg
(原生薬100mgに相当)

添加物として寒梅粉、金箔、
精製セラックを含有する

【**保管及び取扱い上の注意**】

- 直射日光の当たらない
湿気の少ない涼しい所
に保管すること
- 小児の手の届かない
所に保管すること
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因に
なったり品質が変わる)