

小児用ブリル内服液

虚弱体質、滋養強化に

第3類医薬品

病後の体力低下・食欲不振・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給 小児用ブリル[®]内服液



第3類医薬品
20mL×5

小児用ブリル内服液

第3類医薬品

虚弱体質、滋養強化に

第3類医薬品
虚弱体質、滋養強化に

開封口

小児用ブリル[®]内服液

成分・分量 1本(20mL)中

タウリン.....250mg
ニンジンエキス(原生葉換算133.3mg).....20mg
ゴオウ抽出液(原生葉換算0.85mg).....4mL
チアミン塩化物塩酸塩(V.B₁).....0.5mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(V.B₂).....0.5mg
添加物としてクエン酸、白糖、安息香酸Na、香料、エタノール、
プロピレングリコール、グリセリンを含有する。

用法・用量

3才以上15才未満1回1本(20mL)、1日3回食後に服用してください。

[注意]幼小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

効能・効果

滋養強化、虚弱体質、幼小児の発育期・偏食児・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給

発売元



日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

https://www.nippo-yakuhin.jp/

お客様相談室 03-3370-7174(代表)

使用上の注意

相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
皮膚:発疹／消化器:胃部不快感、下痢
- しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

取扱い上の注意

- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

まれに沈殿(生葉による)を生じることがありますが、薬効には変わりありません。
ビタミンB₂が配合されていますので、尿が黄色くなることがあります。

副作用被害救済制度の問合せ先
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)



製造販売元
福井製薬株式会社
大阪市城東区今福東3丁目1番20号 11501231