

ご使用に際して、この文書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

抗菌アイルビー

10mL

眼科用薬

- サルファ剤(スルファメトキサゾールナトリウム)配合
結膜炎やものもらいの原因であるブドウ球菌などの細菌に優れた抗菌作用を示します。
- 2つの抗炎症剤(イプシロン-アミノカプロン酸、グリチルリチン酸二カリウム)配合
2つの抗炎症剤が細菌等による目のかゆみ、痛み、はれなどの症状を鎮めます。
- タウリン配合
目に栄養を与え細胞感染により傷ついた目の組織修復に役立ちます。
- 防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、パラベン類)無添加
薬物アレルギーや角膜上皮細胞に障害を与える危険性があるといわれている防腐剤を含んでいません。

⚠[使用上の注意]



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないこと

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3)次の症状のある人：はげしい目の痛み。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、 かゆみ
目	充血、 かゆみ、 はれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 3～4日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】 結膜炎(はやり目)、ものもらい、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかゆみ

＜「ものもらい」についての注意＞

まぶたをこすったり、その他、目に刺激を加えないように注意してください。(なお、ものもらいは体質的に起こりやすい場合がありますが、過労や睡眠不足などで体力が低下しているときに起こりやすいので、過労をさけ、睡眠を十分とるよう心がけてください)

【用法・用量】 1回2～3滴、1日3～6回点眼してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先が、まぶたやまつ毛などに触れると、目やにや雑菌などのため、薬液が汚染または混濁することがありますのでご注意ください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)ソフトコンタクトレンズの装着液として、またソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)本剤は、点眼用にのみ使用してください。

【成分・分量】

有効成分	含有量 (100 mL中)	はたらき
①スルファメトキサゾールナトリウム	4000mg	いろいろな細菌にすぐれた抗菌作用を示し、また長時間持続します。
②グリチルリチン酸二カリウム	200mg	生薬の甘草に由来する成分。炎症による目のかゆみ、まぶたのただれなどの症状を鎮めます。
③イプシロン-アミノカプロン酸	1000mg	炎症の原因となる物質(プラスミン)の産生を抑え、炎症症状を鎮めます。
④タウリン	200mg	目に栄養を与えるとともに代謝改善作用が傷んだ目の組織修復を助けます。

添加物としてホウ酸、ホウ砂、チオ硫酸ナトリウム水和物、エデト酸ナトリウム水和物を含有しています。

＜成分・分量に関連する注意＞

本剤は点眼後、ときに口中に苦味または甘味を感じることがあります。これは成分であるスルファメトキサゾールナトリウム及びグリチルリチン酸二カリウムが涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に車のダッシュボード等、高温下に放置すると、容器の変形や薬液の変化が生じるおそれがあります。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4)汚染をさけるため、他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかにご使用ください。
- (6)保存状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとってからご使用ください。
- (7)容器に他のものを入れて使用しないでください。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記までお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談窓口

電 話： **03-3370-7174** 受付時間：午前9：00～午後5：00(土、日、祝日を除く)

発 売 元 **日邦薬品工業株式会社** 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16

企 画 元 **牛津製薬株式会社** 〒849-0304 佐賀県小城市牛津町下砥川1-2

製造販売元 **佐賀製薬株式会社** 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481