

第2類医薬品

かぜ薬……漢方薬(葛根湯エキス)配合  
**新 タウロ感冒レッド** (カプセル剤)



## 使用上の注意

(本剤はかぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています)

**してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

## 1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

## 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等  
(鼻炎用内服薬、乘物酔い薬、アレルギー用薬等)

## 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある。)

## 4. 服用前後は飲酒しないこと

## 5. 長期連用しないこと

**相談すること**

## 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

## 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼 吸 器	息切れ、息苦しさ
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起ることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーキス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死溶解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
口のかわき、眠気

## 4.5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和



鼻水



発熱



のどの痛み

## 用法・用量

年齢	成人(15才以上)	7才以上15才未満	7才未満
1回量	2カプセル	1カプセル	服用しないこと

1日3回食後なるべく30分以内に水またはお湯と一緒に服用してください。

### ＜用法・用量に関する注意＞

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2) カプセルの取り出し方

右図のように、カプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



カプセルの取り出し方

## 成分とその作用

6カプセル(1日量)中に次の成分を含有いたします。

成 分 名	6カプセル	作 用
葛根湯エキス	1200mg	悪寒、発熱、頭痛に有用な漢方薬です
アセトアミノフェン	600mg	持続性で発汗作用のある解熱鎮痛成分です
クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	くしゃみ、鼻水をおさえます(抗ヒスタミン剤)
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	36mg	せきを鎮めます
グアヤコールスルホン酸カリウム	180mg	せき、たんをとります
無水カフェイン	90mg	頭痛をやわらげます

葛根湯エキス(1200mg)は

葛根 2.2g 麻黄 1.1g 大棗 1.1g  
桂皮 0.8g 茄葉 0.8g 甘草 0.6g  
生姜 0.3g

より抽出されています。

添加物：カルメロースCa, ステアリン酸Mg, ヒプロメロース, カラギーナン, ソルビタン脂肪酸エステル

## 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手のとどかない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になつたり品質が変わることがあります)

(4)PTPシートのアルミ箔が破れたり、中身のカプセルが変形しないように保管及び携帯に

ご注意ください。(褐変したり品質が変わることがあります)

(5)使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は服用しないでください。

本品のお問い合わせは、お求めのお店又は日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

「電話:03-3370-7174(代表)」にお願いいたします。

受付時間・・・・・・・9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発 売 元: 日邦薬品工業株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元: 福井製薬株式会社

〒536-0002 大阪市城東区今福東3丁目1番26号

22102231