

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

東洋の疎経活血湯 (そけいかっけつとう)

第2類医薬品

本剤は、「万病回春：巻五」に収載されている疎経活血湯に準拠して製造された煎薬用の紙パック剤です。



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| (1) 医師の治療を受けている人。 | (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起したことがある人。 |
| (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 | (6) 次の症状のある人。 : むくみ |
| (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。 | (7) 他の診断を受けた人。 : 高血圧、心臓病、腎臓病 |
| (4) 高齢者。 | |

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

関節痛・神経痛、腰痛、筋肉痛

【用法・用量】

1包（1日量）につき水400mLを加えて約半量になるまで煮詰め、紙袋とともに煎じかすを取り去り、煎液を食前又は食間2回に分けて服用して下さい。

年 齢	1包(1日量) 煎じ液	1 日 服用回数	年 齢	1包(1日量) 煎じ液	1 日 服用回数
大人(15才以上)	全 量	2回に 分けて	4才未満 2才以上	1 / 3 量	2回に 分けて
15才未満 7才以上	2 / 3 量		2才未満	1 / 4 量	
7才未満 4才以上	1 / 2 量				

〈用法及び用量に関連する注意〉

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

(2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること。

(3) 用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】 [本品 1包 (1日量) 27.5 g 中]

日本薬局方 トウキ.....2.0g	日本薬局方 シャクヤク.....2.5g	日本薬局方 リュウタン.....1.5g
日本薬局方 ジオウ.....2.0g	日本薬局方 ゴシツ.....1.5g	日本薬局方 ショウキョウ.....0.5g
日本薬局方 ソウジツ.....2.0g	日本薬局方 イレイセン.....1.5g	日本薬局方 チンピ.....1.5g
日本薬局方 センキュウ.....2.0g	日本薬局方 ボウイ.....1.5g	日本薬局方 ピヤクシ.....1.0g
日本薬局方 ツクニン.....2.0g	日本薬局方 フヨウカツ.....1.5g	日本薬局方 カンゾウ.....1.0g
日本薬局方 ブクリョウ.....2.0g	日本薬局方 ポウフウ.....1.5g	

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと。

(4) 煎じ薬は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用すること。



[問い合わせ先]

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0721-23-4193

受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931

製造販売元 東洋漢方製薬株式会社

〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号