

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。  
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

# 東洋漢方の麦門冬湯エキス顆粒(分包)

(ばくもんどうとう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「金匱要略」に収載されている麦門冬湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

## 次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。



## 相談すること

## 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| (1)医師の治療を受けている人。     | (5)次の症状のある人。: むくみ          |
| (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。 | (6)次の診断を受けた人。: 高血圧、心臓病、腎臓病 |
| (3)水様性の痰の多い人。        |                            |
| (4)高齢者。              |                            |

## 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

## 3.1ヵ月位(からせきに服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合には服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 4.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## [効能・効果]

痰のきれにくい咳、気管支炎、気管支ぜんそく

## [用法・用量]

下記の量を食間又は空腹時に水又は温湯にて服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回	7才未満4才以上	1/2包	
15才未満7才以上	2/3包		4才未満2才以上	1/3包	3回

## &lt;用法・用量に関する注意&gt;

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)用法・用量を厳守すること。
- (3)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること。

## [成分・分量] [本品1日量3包(1包3.0g)中]

日本薬局方 バクモンドウ	10.0g	日本薬局方 タイソウ	3.0g
日本薬局方 ハンゲ	5.0g	日本薬局方 二シジン	2.0g
日本薬局方 コウベイ	5.0g	日本薬局方 カンゾウ	2.0g
より製した水製乾燥エキス			3.943g

添加物として乳糖、バレイショデンプンを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に使用すること。
- (5)本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります、効果には変わりありません。



## [問い合わせ先]

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0120-00-1040

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
電話 0120-149-931

製造販売元

〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号