

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

下痢止め薬

下痢・食あたりに

紫香

特徴

紫香は、カンゾウエキス、ゲンノショウコエキス、タンニン酸ベルベリンというような天然物由来成分を配合した下痢止め・整腸剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
（目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。）
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
（母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある。）



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - （1）医師の治療を受けている人。
 - （2）発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - （3）急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・吐き気等の症状を伴う下痢のある人。
（本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがある。）
 - （4）妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - （5）高齢者。
 - （6）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - （7）次の症状のある人。
排尿困難
 - （8）次の診断を受けた人。
心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
口のかわき、便秘、下痢、目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

（裏面につづく）

その他の注意

母乳が出にくくなることもある。

〔効能・効果〕

下痢、腹痛を伴う下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

〔用法・用量〕

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人(15才以上)	1 包	3 回 ○服用間隔は4時間以上おくこと。
11才以上15才未満	2/3 包	
8才以上11才未満	1/2 包	
5才以上8才未満	1/3 包	
3才以上5才未満	1/4 包	
3才未満	服用しないこと	

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分・分量〕

1 日 量 (3 包) 中

成 分	含 量	説 明
ゲンノショウコエキス (ゲンノショウコ乾燥エキス)	500mg (原生薬換算2,750mg)	収れん作用により、下痢を止めます。
ロートエキス散	500mg (ロートエキスとして50mg)	鎮痛、鎮痙作用により、痛みを和らげます。
タンニン酸ペルベリン	300mg	腸内細菌に対する殺菌作用と収れん作用により、下痢を止めます。
カンゾウエキス (カンゾウエキス末)	130mg (原生薬換算910mg)	解毒作用があり、胃粘膜の障害を防ぐ作用があります。

添加物としてウメエキス、ソヨウ末、乳糖水和物、カルメロースNa、パレイシヨデンブ、香料を含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれる等、何かお気付きの点がございましたら、お問い合わせの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電 話：03(3370)7174(代表)
受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発売元 日邦薬品工業株式会社 製造販売元 牛津製薬株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16 佐賀県小城市牛津町下砥川1-2