

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

ビタミン含有保健薬

第2類医薬品

# 若甦ロイヤルカプセル

若甦ロイヤルカプセルは、古来より滋養強壯生薬として知られている紅参<sup>コウジン</sup>、牛黄<sup>ゴウワウ</sup>、鹿茸<sup>シヨウ</sup>、淫羊藿<sup>インヨウカク</sup>、ローヤルゼリーにからだの代謝に必要なビタミンE、B<sub>1</sub>、B<sub>2</sub>、B<sub>6</sub>を配合したカプセル剤です。

滋養強壯、虚弱体質のほか、肉体疲労や病中病後などの場合の栄養補給に適したビタミン含有保健薬です。



## 使用上の注意



## 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

- ・滋養強壯、虚弱体質
- ・肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・妊娠授乳期・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給

## 用法・用量

次の量を服用してください

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15才以上)	2カプセル	2回
15才未満	服用しないこと	

## <用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守してください
- (2)カプセルの取り出し方

PTP包装の場合は、図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります)



## 成分・分量

成人1日量（4カプセル）中に次の成分を含んでいます

成分	含量	はたらき
コウジン（紅参）乾燥エキス	80mg (原生薬として800mg)	オタネニンジン蒸して製したもので、古くからすぐれた滋養強壮効果が認められています
ゴオウ（牛黄）末	3mg	ウシ（牛）の胆のうに生じた褐色の小球塊で、強壯剤として広く用いられています
ロクジョウ（鹿茸）末	30mg	雄シカ（鹿）の幼角（袋角）を乾燥したもので、古くから広く用いられ、強壯にすぐれた効きめがあります
インヨウカク（淫羊藿）乾燥エキス	40mg (原生薬として320mg)	イカリ草とも呼ばれ、強壯効果がある生薬として多く用いられています
ローヤルゼリー末	100mg	女王蜂を育てる特殊な物質がローヤルゼリーで、一名王乳とも呼ばれています タンパク質、炭水化物、アミノ酸、ミネラル、ビタミンなどを含有しており栄養に富み、滋養強壯効果があります
ビタミンE散	20mg (トコフェロール酢酸エステルとして10mg)	全身の血液の流れをよくし、全身に酸素や栄養素を運びます
チアミンジスルフィド（ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体）	20mg	中枢神経や末梢神経の働きを正常に保つ作用があり、激しいスポーツなどで肉体的疲労時に消耗するビタミンB <sub>1</sub> を補います
リボフラビン（ビタミンB <sub>2</sub> ）	10mg	脂肪などを燃やしてエネルギーに変える際に必要なビタミンです
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB <sub>6</sub> ）	20mg	タンパク質の成分であるアミノ酸の合成や分解に働くビタミンです

添加物として、無水ケイ酸、トウモロコシデンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、カプセルにゼラチン、ラウリル硫酸Na、三二酸化鉄を含有しています

## <成分・分量に関連する注意>

本剤に配合されているリボフラビン（ビタミンB<sub>2</sub>）により、尿が黄色になることがあります

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください（瓶入りの場合は密栓して保管してください）
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください

## 本製品についてのお問い合わせ先

- ・お買い求めのお店
- ・日邦薬品工業株式会社 学術情報室  
住 所：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16  
電 話：(03)3370-7174 (代表)  
受付時間：午前9：00から午後5：00まで（土、日、祝日を除く）

発 売 元  **日邦薬品工業株式会社**  
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元  **日東薬品工業株式会社**  
京都府向日市上植野町南開35-3