第2類医薬品

ちょうじょう こう じん ほう じょう

長城甦腎宝錠 A

- ●長城甦腎宝錠Aは、「腎」の機能を補うロクジョウ、オウギ、エゾウコギをはじめ13種類の生薬とビタミンB」を配合した、働き盛りの中高年の方に優れた効果を発揮する滋養強壮薬です。
- ●年齢に伴う身体機能の衰えを感じている方におすすめの、中医学の考えに基づいたお薬です。
- ●中医学で「腎」とは、泌尿、生殖、内分泌、中枢神経、免疫などの総括的な機能をさし、この機能が衰えた状態を「腎虚」と言います。 「腎虚」は疲労、性欲減退、食欲不振などの症状があらわれます。
- ●清涼感のある香りがする黒褐色のフィルムコーティング錠です。

- / (使用上の注意)



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹·発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

「効能・効果〕

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の 栄養補給

〔用法・用量〕

下記1回量を1日3回服用してください。

年 齢	1回量
成人(15歳以上)	3錠
15歳未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

用法·用量を厳守してください。

〔成分・分量〕

9錠(成人1日服用量)中に、次の成分を含有します。

-3c()30() - 130() - 12			
成 分		分 量	
ロクジョウ末	250 mg		
エゾウコギ乾燥エキス	133.33 mg	(原生薬として3,000mgに相当)	
サンシュユ末	50 mg		
ジオウ乾燥エキス	120 mg	(原生薬として300mgに相当)	
オウセイ末	250 mg		
トシシエキス	14.29 mg	(原生薬として130mgに相当)	
クコシエキス	100 mg	(原生薬として250mgに相当)	

成 分	分量
オウギ乾燥エキス	80 mg(原生薬として640mgに相当)
ニンジン乾燥エキス	42.86 mg(原生薬として600mgに相当)
サンヤク末	30 mg
リュウガンニクエキス	90.91 mg (原生薬として300mgに相当)
ブクリョウ末	300 mg
ビャクジュツ末	100 mg
チアミン硝化物(ビタミンBi)	20 mg

添加物として、乳糖、二酸化ケイ素、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、dーボルネオール、クロス CMC-Na、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、カルナウバロウ、黄色4号(タートラジン)、赤色2号、青色2号を含有します。

〈成分・分量に関する注意〉

錠剤の表面が白っぽくなったり、結晶があらわれる場合がありますが、配合成分による物であり、品質には問題ありません。

(裏面へ続く)

ロクジョウ[鹿茸]

マンシュウジカ の雄の幼角で、 強壮·強精薬とし て用いられます。



エゾウコギ(刺五加)

ウコギ科エゾウ コギの根茎で、疲 労回復·滋養強壮 に用いられます。



サンシュユ[山茱萸]

ミズキ科サンシュユ の果実で、滋養強壮・ 強精薬として用いら れます。



ジオウ[地黄]

ゴマノハグサ科アカ ヤジオウの根茎で、 補血強壮薬として用 いられます。



オウセイ[黄精]

ユリ科ナルコユリの根 茎で、滋養強壮薬とし て、病後の虚弱症など に用いられます。



トシシ[菟絲子]

ヒルガオ科マメダオ シ又はネナシカズラ の種子で、強壮薬と して用いられます。



クコシ[枸杞子]

ナス科クコの果 実で、強壮薬とし て用いられます。



オウギ[黄耆]

マメ科キバナオウギ の根で、強壮薬とし て用いられます。



ニンジン[人参]

ウコギ科オタネニンジン の根で、疲労回復・胃腸 虚弱·食欲不振などに用 いられます。



サンヤク[山薬]

ヤマノイモの根茎 で、食欲不振・滋養強 壮に用いられます。



リュウガンニク[竜眼肉]

ムクロジ科リュウガン の仮種皮で、鎮静・滋 養強壮薬として用い られます。



ブクリョウ[茯苓]

サルノコシカケ科マ ツホドの菌核で、鎮 静·利尿薬として広く 用いられます。



ビャクジュツ[白朮]

キク科オケラ又はオ オバナオケラの根茎 で、健胃・整腸・利尿薬 として用いられます。



[保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)ビンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。
- (5)本剤をぬれた手で取り扱わないでください。(水分が錠剤に付くと、表面が一部溶けて変色又は色むらを 生じることがあります。)
- (6)ビンの中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので 取り除いてください。
- (7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記まで ご連絡くださいますようお願い申しあげます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電話:03-3370-7174(代表) 受付時間 9:00 ~ 17:00(土、日、祝日を除く)



東京都渋谷区代々木3丁目46番16号

製造販売元 アスゲン 製薬株式会社 岐阜県瑞浪市山田町字小洞2008