

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また必要ときに読めるように大切に保管しておいてください。

第2類医薬品

痔の薬 粒状

(じのくすり)

製品の特徴

本剤は、類黄褐色の顆粒で、特異臭があり、甘苦味があります。



使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬(下剤)
- 2.授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

■ 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5) 高齢者。
 - (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。 下痢、むくみ
 - (8) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はきけ・嘔吐、食欲不振、 はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1ヶ月くらい（きれ痔に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

効能・効果

痔核、脱肛、肛門掻痒、痔出血、きれ痔

用法・用量

大人は1回に1包（1.6g）ずつ、1日3回食前または食間に、水または温湯にて服用してください。小児用量は大人用量を1とするとき、

15歳以下8歳まで 1/2量 4歳以下2歳まで 1/6量

7歳以下5歳まで 1/3量

また服用に際して、次のことに注意してください。

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

本剤は大人1日の服用量3包（4.8g）中に次の成分を含んでいます。

日局サ イ コ1.2g	日局ダ イ オ ウ0.4g
日局ト ウ キ1.2g	日局オ ウ レ ン0.3g
日局オ ウ ゴ ン1.0g	日局シ ョ ウ マ0.6g
日局カ ン ゴ ウ	3.0gに対応する水浸エキス		

保管および取り扱い上の注意

- (1) お子さまの手のとどかない所に保管してください。
- (2) 品質を保つため、直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。
- (3) 誤った用い方をさけ、品質を保つために、他の容器に入れかえないでください。

その他

- 本剤は生薬（薬用の草根木皮など）を原料とした薬ですので、製品により、顆粒の色調などが多少異なることがあります。効能・効果にかわりありません。
- 長い間保存して、再び服用される場合は、薬が湿っていないか、不快なおいがないか、虫害がないかなどをよく確かめてから、服用してください。

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

長倉製薬株式会社 ☎06-6652-5000

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元



長倉製薬株式会社

大阪市西成区聖天下 1-7-16

長倉の漢方薬